Castellazzi Dr. Marco info@studiocastellazzi.com www.studiocastellazzi.com
Tel 00 39 011387684 ; 00 39 0116502868 ; Via Giuseppe Baretti 1 /H 10125 Torino

BOTULINO

Medicina estetica

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE INIEZIONI DI TOSSINA BOTULINICA PER SCOPI ESTETICI

Lo studio Castellazzi non pone distinzioni tra Chirurgia e Medicina Estetica, si cerca un'integrazione per ottenere risultati duraturi nel tempo. Infatti, prevenire i meccanismi cutanei che provocano l'invecchiamento è il primo passo per mantenere più a lungo un aspetto giovane. Nella maggior parte dei casi, questo aiuta a rimandare o a evitare un intervento chirurgico in età più avanzata. I professionisti tendono ad evitare gli interventi troppo invasivi, che cambiano l'aspetto della persona; in particolare, non si ricorre più al bisturi se l'inestetismo da correggere si può risolvere con la Medicina Estetica. Per esempio, nel caso una donna abbia borse oculari troppo accentuate, è ideale l'intervento di Blefaroplastica. Se invece il contorno occhi è segnato dalle zampe di gallina, è preferibile optare per un ritocco con Filler riempitivo e il botulino.. Per interventi meno invasivi, non chirurgici, ci si avvale di moderne tecniche della medicina estetica. Botox o Botulino

La tossina botulinica è un farmaco sempre più utilizzato in medicina estetica, ed è costituito da tossina botulinica di tipo A purificata, la cui iniezione provoca il blocco dell'impulso nervoso ai muscoli.

Il botulino è quindi utilizzato per eliminare le cosiddette rughe d'espressione, causate dalla contrazione dei muscoli mimici, tra le sopracciglia, le rughe interciliari, le zampe di gallina e per il trattamento dell'iperidrosi (eccessiva sudorazione). Le rughe d'espressione vengono efficacemente trattate dalla tossina purificata del botulino di tipo "A", ammessa recentemente in Italia . Elimina temporaneamente la causa principale delle rughe, donando una pelle nuova, lucente, senza quelle piccole "increspature" che danno la visione dell'età

La tossina botulinica è un farmaco sempre più utilizzato in medicina estetica, ed è costituito da tossina botulinica di tipo A

che avanza. ... Le rughe si attenuano 5 o 8 giorni dopo, dopo circa 12 ore dal trattamento la cliente può truccarsi, raramente si forma una piccola ecchimosi, un leggero gonfiore e rossore persiste per un paio d'ore. I risultati durano in genere 4-5 mesi dopo di che il trattamento va ripetuto, meglio prima che il muscolo riprenda la sua contrattilità,è stato messo in evidenza che, dopo diverse sedute, l'effetto terapeutico dura più a lungo.
I risultati migliori si ottengono a livello del distretto superiore del viso, sulle rughe orizzontali della fronte, su quelle verticali tra le sopraciglia e su quelle perioculari nella zona delle "zampe di gallina".

Botulino - storia e origini

Nel 1977 viene utilizzata per la prima volta la tossina botulinica per il trattamento dello strabismo.
A partire dai primi anni '90 si è iniziato a studiare il botulino per l'utilizzo in chirurgia estetica, anche se per i primi anni è stata utilizzata sopratutto nel trattamento delle patologie caratterizzate dalla presenza di spasmo muscolare e distonia (in oculistica lo strabismo o blefarospasmo).

La tossina botulinica è una sostanza prodotta dal batterio *Clostridium Botulinum*.

Cos'è la tossina botulinica .

La tossina botulinica è una sostanza prodotta dal batterio *Clostridium Botulinum*.
Il trattamento consiste nell'iniettare, in specifici punti facciali, quantità minime di botulino con lo scopo di ridurre la forza e continuità del corrugamento muscolare responsabile delle rughe mimiche.
Iniettata nei muscoli provoca il blocco del rilascio dell'acetilcolina che è la sostanza che viene rilasciata dai nervi per trasmettere al muscolo lo stimolo per la contrazione.
Quindi il muscolo nel quale la tossina viene iniettata si blocca (paralisi).

Indicazioni per il trattamento con la tossina botulinica

Sicuramente la tossina botulinica può ridurre e attenuare le rughe di espressione **che sono causate da un uso continuo dei** muscoli mimici **della fronte, corrugare le sopracciglia o arricciare il naso, o avere un'espressione sempre corrucciata e preoccupata.**
Ricordiamo che il botulino può correggere soltanto le rughe e i solchi causati dall'azione dei muscoli mimici **e non se sono provocati dall' invecchiamento cutaneo (fotoinvecchiamento cutaneo) o se sono rughe molto profonde.**
In questi casi la tossina botulinica può essere associata ad altri trattamenti medici e non quali fillers (Collagene, Acido jaluronico), peeling, lifting o blefaroplastica, trattamenti laser skin resurfacing.

Con la tossina botulinica possono essere trattati i seguenti inestetismi e patologie:

Rughe frontali (rughe orizzontali della fronte	Rughe interciliari	Rughe delle labbra (intorno alla bocca)	Rughe e solchi glabellari (tra le sopracciglia)	Zampe di gallina (rughe intorno agli occhi)
Rughe di espressione	Ringiovanimento del Viso ad effetto lifting	Iperidrosi	Cefalee croniche	Strabismo
Blefarospasmo	Distonia cervicale	Spasmo dello sfintere anale	Disturbi della deglutizione	Spasmo muscolare da paralisi cerebrale
Disordini del movimento (spasticità)	Decolte'	Mento e mandibola	Gluteo	Seno

Come avviene il trattamento ?

Il trattamento con la tossina botulinica è ambulatoriale**, senza ricovero e** senza anestesia**, e dura 15-20 minuti. Prima di procedere con le microiniezioni la tossina botulinica viene chiesto al cliente di contrarre i muscoli facciali: corrugare la fronte, aggrottare le sopracciglia o arricciare il naso; in questo modo, vengono individuati i muscoli maggiormente responsabili della formazione delle rughe; in alternativa, vengono individuate le terminazioni nervose con uno speciale apparecchio. Nella maggior parte dei casi, le micro iniezioni vengono praticate direttamente nel muscolo. Il farmaco non serve a riempire le rughe come i classici Fillers (per esempio l'acido ialuronico)**
La tossina botulinica viene iniettata con una piccola siringa **in moderata quantità all'interno dei muscoli mimici, ovvero di quelli da cui si originano le rughe d'espressione da eliminare.**

Effetti collaterali e controindicazioni con la tossina botulinica

Il botulino prodotto è ampiamente sperimentato da molti anni in campo oculistico e nel campo della chirurgia estetica, e non vi sono particolari controindicazioni o complicanze.
Sono molto rare le reazioni allergiche**, e si consiglia di non iniettarlo in gravidanza, o se il paziente ha problemi neuromuscolari.**
Raramente vi può essere una ptosi o abbassamento della palpebra superiore**, della durata di 3-4 settimane e quindi reversibile.**

Dopo il trattamento con il botulino

Il viso dopo l'infiltrazione si presenta leggermente arrossato **dove è stata effettuata l'iniezione il preparato , ma per pochi minuti.**
Occasionalmente vi può essere un livido che però tende a riassorbirsi in pochi giorni.
Possono essere presenti solamente dei leggeri bruciori **per i primi due giorni.**
E' possibile iniziare a truccarsi già dopo 10 minuti dall'infiltrazione di botulino , e ci si potrà esporre al sole dopo circa dieci giorni**.**
La ripresa di tutte le normali attività è immediata.

Durata dei risultati della tossina botulinica

Le infiltrazioni di tossina botulinica cominciano a dare risultati apprezzabili dopo 2-5 giorn fino a 10 gg **dal trattamento, con il rilassamento del muscolo corrugatore, e raggiungono dopo un mese la massima efficacia.**
I risultati durano per altri 4-5 mesi**, e poi scompaiono gradualmente.**



Quanto dura l'intervento

La durata della seduta è di circa 20 minuti**, e non è necessaria alcuna anestesia. Il trattamento con la tossina botulinica non necessità di alcun periodo di degenza. Si può tornare da subito alle normali attività. Non ha importanti effetti collaterali. E' da evitare l'iniezione in gravidanza ed in presenza di patologie neuromuscolari ed allergiche. Si consiglia di non assumere aspirina o simili nelle due settimane prima del trattamento. L'assunzione di antibiotici aminoglicosidici (ad esempio, streptomicina, gentamicina etc..) rappresenta una controindicazione relativa in quanto può potenziare gli effetti del farmaco.**

Quale età per il trattamento con la tossina botulinica

Se il paziente lo richiede, e vi è una reale e valida indicazione terapeutica, non si può dire che esista un'età precisa per sottoporsi a questo intervento (dai 20 ai 90 anni di età). In genere l'uso del botulino al di sotto di 12 anni non è raccomandato.

Botulino e lifting non chirurgico

Il lifting non chirurgico mediante la tossina botulinica si ottiene riducendo la trazione dei muscoli del sopracciglio **che spingono verso il basso, a vantaggio dell'azione dei muscoli che lo spingono verso l'alto.**
Il risultato è un lifting del sopracciglio **(sollevamento lieve) e uno sguardo rilassato e ringiovanito.**

Botulino e iperidrosi

Per tutti i pazienti che soffrono di iperidrosi (sudorazione eccessiva) **con le infiltrazioni di tossina si può bloccare completamente la sudorazione nelle le** mani, **le** ascelle **e i** piedi.
Ovviamente il trattamento è temporaneo e per mantenere stabili i risultati dev'essere ripetuto ogni 6 mesi circa.

Gentile cliente i pagamenti accettati in questa struttura sono i seguenti ...

In contanti fino a mille euro	Con assegno	Con POS	Con cellulare e tecnologia NFC